

Số: 10/TBCĐ-DVNN

Kinh Môn, ngày 12 tháng 9 năm 2023

THÔNG BÁO

Tình hình dịch hại đến ngày 12/9/2023

Khuyến cáo một số đối tượng dịch hại trên trà lúa mùa trung và mùa muộn từ nay đến cuối vụ

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết

Thời gian qua, thời tiết nắng, mưa xen kẽ. Nhiệt độ TB 26-27°C, cao 33-34°C, thấp 24-25°C; ẩm độ trung bình 60-80%.

2. Cây trồng

- Trà mùa sớm, trung: Giai đoạn đòng già - chắc xanh - chín.
- Trà mùa muộn: Diện tích 854,65ha; gồm Nếp cái hoa vàng. Giai đoạn phân hóa đòng.

II. TÌNH HÌNH DỊCH HẠI ĐẾN NGÀY 12/9/2023

1. Trên trà lúa mùa trung và lúa mùa muộn

- Chuột gây hại rải rác với tỷ lệ hại trung bình 1-2% số dảnh, cao 3-5% số dảnh.
- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại cục bộ trên những diện tích cây dày, cây cây to, chăm bón không cân đối và không được phun trừ kịp thời. Hiện nay sâu đang ở giai đoạn nhộng - trưởng thành, với mật độ trung bình từ 3-5 con/m², cao từ 10-20 con/m², cá biệt từ 30-50 con/m².

- Sâu đục thân: Hiện nay trưởng thành đã xuất hiện rải rác.

- Rầy nâu, rầy nâu nhỏ, rầy lưng trắng gây hại rải rác. Đang giai đoạn tuổi 3-trưởng thành, gây hại ở một số diện tích lúa xanh tốt, cây dày, bón thừa đạm.

- Bệnh khô vằn gây hại tăng với tỷ lệ bệnh trung bình 5-10% số dảnh, cao 10-20% số dảnh.

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô đầu lá, vàng lụi, bệnh thối thân,... gây hại rải rác.

2. Trên dưa, bầu bí: Bệnh phấn trắng, sương mai, giả sương mai gây hại rải rác.

3. Trên rau các loại: Sâu xanh da láng gây hại gia tăng trên hành (mùa).

4. Trên ngô: Sâu keo mùa thu gây hại nhẹ; bệnh đốm lá, bệnh rỉ sắt gây hại rải rác ngô đang ở thời kỳ trổ cờ trở đi.

5. Trên ổi: Bọ phấn, rệp sáp, giòi đục quả, ... gây hại rải rác.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Đối với lúa mùa trung, mùa muộn

- Chuột tiếp tục gây hại gia tăng từ nay đến cuối vụ.
- Sâu cuốn lá nhỏ lúa 6 tiếp tục gây hại mạnh trên trà lúa mùa trung và lúa mùa muộn giai đoạn đòng cái - đòng già (dự kiến sâu non lúa 7 nở và gây hại tập trung từ nửa cuối trung tuần tháng 9 trở đi).

- Sâu đục thân, rầy các loại tiếp tục gây hại từ nay đến cuối vụ.
- Bệnh khô vằn tiếp tục gây hại gia tăng trên những diện tích cấy dày, chăm bón thừa đạm, xanh tốt.
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, khô đầu lá, vàng lụi: Có xu hướng gây hại tăng trên những diện tích giống lúa nhiễm do ảnh hưởng của các đợt mưa giông kéo dài, điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
- Bệnh đen lép hạt, đạo ôn cổ bông: Tiếp tục phát sinh, phát triển khi lúa trở gập mưa.
- Bệnh thối thân: Tiếp tục phát sinh, phát triển từ nay đến cuối vụ (đặc biệt giai đoạn chắc xanh - đổ đuôi).

2. Trên nhóm dưa, bầu bí: Bọ phấn, bọ trĩ, bệnh giả sương mai, phấn trắng có xu hướng tiếp tục gây hại gia tăng.

3. Trên rau các loại: Sâu xanh da láng gây hại gia tăng trên hành (mùa).

4. Trên ngô: Bệnh gỉ sắt, đốm lá tiếp tục gây hại tăng trên những ruộng trồng dày ở giai đoạn trổ cờ trở đi; sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại trên ngô ở những diện tích từ giai đoạn ngô 4-6 lá đến xoáy nõn trên những diện tích không được phun trừ kịp thời.

5. Trên ổi: Bọ phấn, rệp sáp, ... tiếp tục gây hại rải rác.

IV. BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO

Trước tình hình trên Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã khuyến cáo các HTX DVNN hướng dẫn nông dân một số giải pháp sau:

1. Trà lúa mùa trung, mùa muộn

- Tăng cường diệt chuột bằng mọi biện pháp an toàn, hiệu quả, ưu tiên biện pháp thủ công.

- Đối với trà lúa mùa trung giai đoạn đòng già - thấp tho trổ phun trừ sâu cuốn lá nhỏ lúa 7, sâu đục thân từ ngày **18 - 22/9/2023**. Bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Sunset 150SC, Map Dona 265EC, Dylan 10EC, Dofenapyr 140SC, Prevathon 5SC, Virtako 40WG, Voliam Targo 063SC.

+ Phun trừ rầy nâu, rầy nâu nhỏ, rầy lưng trắng: Khi mật độ từ 1.500 - 2.000con/m² bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Phoppaway 80WG, Chersieu 600WG, Chess 50WG, Chatot 600WG,... liều lượng, sử dụng phun theo hướng dẫn trên bao bì.

+ Phun trừ bệnh đen lép hạt bằng các loại thuốc như: Tilt super 300EC, Nevo 330EC, Amistartop 325SC, Nativo 750WG,...

+ Phun trừ bệnh đạo ôn cổ bông: Bump 650WP, Beam 75WP, Folia 525SE, Bankan 600WP, Tigon Diamon 800WP,...

+ Chủ động phun trừ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô đầu lá bằng một trong các loại thuốc như: Lobo 8WP, Ychatot 900SP, Total 200WP, Xantocin 40WP, Map Lotus 125WP, Avikhuan 105SP, Antracol 70 WP,... phun kết hợp với thuốc ComCat 150WP.

- Đối với trà lúa mùa muộn giai đoạn phân hóa đòng phun trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, khô vằn,... bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như sau: Dofenapyr 140SC, Prevathon[®]5 SC, Virtako 40 WG, Emaben 3.6 EC,... và phun

kết hợp với thuốc trừ bệnh khô vằn như Nevo 330EC, Validacin 3SL, Nativo 750WG, Amistartop 325SC,...

+ Phun trừ rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ bằng một trong các loại thuốc sau: Chess 50WG, Chersieu 50WG, Chatot 600WG,...

*** Một số lưu ý khi khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc BVTV**

- Do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, bệnh phát sinh gây hại gia tăng, sâu ra dãi lúa với mật độ cao nên giai đoạn này khuyến cáo nông dân lựa chọn các loại thuốc chất lượng, hiệu lực kéo dài và hỗn hợp thêm các loại thuốc có hoạt chất Emamectin benzoate.

- Giai đoạn này cây lúa phát triển xanh tốt bà con cần phun từ 1,5 - 2 bình/1sào bắc bộ và tích cực phun kép (thời gian phun cách nhau 4-5 ngày).

- Khuyến cáo nông dân phun lại nếu ngay sau phun gặp mưa nặng hạt.

- Điều tiết nước hợp lý, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, giảm phân bón vô cơ để giúp cho cây lúa khỏe, tăng sức đề kháng và hạn chế bệnh thối thân.

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng như “*Đúng thuốc, đúng nồng độ liều lượng, đúng lúc, đúng cách*” và mang đầy đủ bảo hộ lao động, thu gom vỏ bao bì về nơi quy định.

2. Đối với cây rau, màu: Tăng cường áp dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp; tăng cường phòng trừ dịch hại bằng cách ngắt tiêu hủy các lá bệnh, cây bệnh....Trường hợp phải phun thuốc BVTV thì chỉ sử dụng các loại thuốc BVTV có trong danh mục đăng ký được khuyến cáo sử dụng trên rau, trong đó ưu tiên chọn các loại thuốc ít độc, thuốc thảo mộc, thuốc vi sinh và phải đảm bảo đúng thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

3. Trên ngô: Tích cực theo dõi và phòng trừ sâu keo mùa thu nhất là trên diện tích ngô từ 3 lá đến xoắn nõn.

4. Trên ôi: Cắt tỉa cành, thu gom, tiêu hủy cành lá, quả thối, rụng để tiêu hủy, diệt nguồn sâu bệnh hại.

5. Đề nghị: Đài phát thanh từ thị xã đến các xã, phường, khu dân cư tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nắm bắt kịp thời và chủ động phòng trừ sâu, bệnh đạt hiệu quả cao nhất./.

Nơi nhận:

- Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh; } (Thay B/c)
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Các phòng, ban liên quan; } (P.hợp)
- HTX DVNN xã, phường;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Cường