

Số: 12/TBCĐ-DVNN

Kinh Môn, ngày 28 tháng 9 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Tình hình dịch hại trên trà lúa mùa muộn cuối vụ**

Hiện nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thời tiết liên tục có mưa vừa đến mưa to kèm theo giông làm ảnh hưởng tới việc thu hoạch lúa mùa sớm, mùa trung, làm đất gieo trồng cây vụ đông và tạo điều kiện thuận lợi cho một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên trà lúa mùa muộn cuối vụ. Nhiệt độ TB 26-28°C, cao 32-33°C, thấp 24-25°C; ẩm độ trung bình 75-90%.

Để làm tốt công tác phòng trừ sâu, bệnh hại. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo HTXDVNN hướng dẫn nông dân thực hiện tốt một số giải pháp sau:

**1.** Tiếp tục đánh bắt chuột bằng các biện pháp an toàn, hiệu quả, ưu tiên biện pháp thủ công.

**2.** Đối với sâu đục thân: tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện thấy mật độ ổ trứng có từ 0.3 ổ/m<sup>2</sup> trở lên hoặc khi lúa đòng già - thấp tho trở 5 - 7% thì tiến hành phun trừ. Nếu mật độ sâu cao cần phun kép lần 2 sau 4 - 5 ngày bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu sau: Prevathon 5SC, Voliam targo 063SC, Virtako 40WG, Emin Gold 160SC, Minecto Star 60WG, ...

*\* Lưu ý: phun thuốc vào sáng sớm hoặc chiều tối mát, tránh thời điểm lúa phơi màu.*

**3.** Đối với bệnh khô vằn: Khi bệnh phát sinh với tỷ lệ từ 15-20 % số dảnh trở lên cần phun trừ ngay bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu như: Conabin 750WG; Tilsuper 300EC; Annongvin 50SC; Validan 3SL...;

**4.** Phun phòng, trừ bệnh lem lép hạt bằng một trong những thuốc đặc hiệu sau: Nevo 330EC, Tilt super 300EC, Aproach 250SC,...

**5.** Kiểm tra đồng ruộng nếu thấy mật độ rầy từ 1.500 con/m<sup>2</sup> trở lên (khoảng 50 con/khóm) hoặc 200 - 300 con/m<sup>2</sup> (ở những nơi đã bị nhiễm bệnh lùn sọc đen) thì tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc như: Chess 50WG, Chatot 600WG, Fidur 220 EC, Makoto 50WG, Marshal 200SC, Opal 50WG,... liều lượng, sử dụng phun theo hướng dẫn trên bao bì.

**6.** Phun phòng, trừ bệnh đạo ôn cổ bông giai đoạn lúa đòng già - thấp tho trở bằng một số loại thuốc đặc hiệu như: Ninja 35EC, Beam 75WP, Nativo 750WG, Filia 525SC, Difusan 40EC, Fujione 40EC,...

Ngoài ra theo dõi bệnh lùn sọc đen, vàng lụi khi phát hiện thấy biểu hiện của bệnh báo ngay cho Trung tâm DVNN thị xã để phối hợp lấy mẫu giám định. Điều tiết nước hợp lý để tránh hiện tượng lúa bị nghẹn đòng và tăng cường sử dụng

phân bón hữu cơ để giúp cho cây lúa khỏe, tăng sức đề kháng, hạn chế bệnh thối thân.

**\* Một số lưu ý khi khuyến cáo nông dân sử dụng thuốc BVTV**

- Khi sử dụng thuốc BVTV, bà con cần tuân thủ theo nguyên tắc "4 đúng" và mang đầy đủ bảo hộ lao động, thu gom vỏ bao bì về nơi quy định.

- Giai đoạn này cây lúa phát triển xanh tốt bà con cần phun từ 1,5 - 2 bình/1sào bắc bộ và tích cực phun kép (thời gian phun cách nhau 4-5 ngày) trên những diện tích có mật độ sâu cao, dài lúa để đạt hiệu quả cao nhất.

- Khuyến cáo nông dân phun lại nếu ngay sau phun gặp mưa nặng hạt.

**7. Đề nghị:** Đài phát thanh từ thị xã đến các xã, phường, khu dân cư tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân nắm bắt kịp thời và chủ động phòng trừ sâu, bệnh đạt hiệu quả cao nhất./.

**Nơi nhận:**

- Chi cục Trồng trọt & BVTV tỉnh;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Các phòng, ban liên quan;
- HTX DVNN xã, phường;
- Lưu: VT.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Duy Cường**